



Notts

IbuAliv

FORTE

Alivio de la
Fiebre

Suspensión oral

Ibuprofeno 200 mg/5 mL

Suspensión oral

Vía de administración oral

Venta directa

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o Químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

¿Qué contiene IBUALIV FORTE?

IBUALIV FORTE contiene 4 gramos de Ibuprofeno cada 100 ml de suspensión. Excipientes: c.s. : Polisorbato 80; Benzoato de Sodio; Aspartamo; Acesulfamo potásico; Goma xántica; Sorbitol; Ácido cítrico; Glicerina destilada; Colorante rojo allura; Esencia de tutti frutti; Agua purificada.

¿Para qué se usa IBUALIV FORTE?

Este medicamento está indicado para el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.

Se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza. Resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿Qué personas NO pueden recibir IBUALIV FORTE?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al ibuprofeno o a alguno de los componentes de la fórmula.

No utilizar además si el niño es alérgico a aspirina u otros antiinflamatorios.

Este medicamento contiene acesulfame y aspartamo como edulcorantes (Ver composición)

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico:

- Si el niño se encuentra recibiendo otra medicación, presentó problemas o efectos adversos al emplear antiérgicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran, si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre erupción de la piel, náuseas y/o vómitos.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos; si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción, si aparecen síntomas nuevos.

- Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.

- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.

- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

- No utilizar nunca contra el dolor de estómago o abdomen.

- Usted debe consultar a su médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca).

- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, como trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago), erupción en la piel con ronchas y/o picazón, alteraciones respiratorias, como dificultad para respirar, sensación de falta de aire, vértigo y dolor de cabeza. Raramente el tratamiento puede producir alteraciones de los análisis de laboratorio (aumento de enzimas hepáticas), retención de líquidos, y disminución de los glóbulos blancos.

SI EL DOLOR O LA FIEBRE PERSISTEN POR MÁS DE 2 DÍAS O EMPEORA SU ESTADO GENERAL, CONSULTE A SU MÉDICO.

Advertencias y precauciones:

Hable con su médico o farmacéutico si usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

Infecciones:

Este medicamento puede esconder los signos y síntomas de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUALIV FORTE pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.




Precauciones Cardiovasculares:

Los medicamentos antiinflamatorios/analgésicos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un Ictus, en especial cuando se utiliza en dosis altas. No supere la dosis ni la duración del tratamiento.

¿Cómo usar IBUALIV FORTE?

Agite el frasco antes de usar.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a su médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿Cómo se usa IBUALIV FORTE?	
 <p>1</p>	 <p>2</p>
 <p>3</p>	 <p>4</p>

Luego de utilizar, cierre el frasco simplemente girando la tapa sin hacer presión. Lave la jeringa dosificadora con abundante agua, seque y guarde en el estuche para la próxima utilización.

Dosis habitual en adultos y niños mayores de 12 años de edad para enfermedades inflamatorias: Administrar 400 mg-800 mg 3 a 4 veces al día.

Para el alivio del dolor leve a moderado en adultos, la dosis usual es de 400 mg cada 4-6 horas.

En adultos para el tratamiento de la fiebre, la dosis recomendada es de 200 mg cada 4-6 horas, pudiéndose aumentar a 400mg cada 4 o 6 horas si no se evidencia una adecuada disminución de la temperatura. La dosis máxima es de 1200 mg/día a menos que el médico indique lo contrario.

Como antipirético, en niños entre 6 meses y 12 años, la dosis usual es de 5 o 10 mg/kg para temperaturas inferiores o superiores a 39 °C. La dosis máxima es de 40mg/kg de peso corporal, sin exceder los 3 días de tratamiento.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted está cursando una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

CITUC Pontifica U. Católica de Chile +562 22 635 3800

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Información adicional:

Condiciones de almacenamiento:

Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, lejos del calor y la luz solar directa. Revise regularmente la fecha de vencimiento de los medicamentos. Generalmente, se indica en los envases con dos dígitos que señalan mes y año de caducidad. Expira el último día del mes señalado. Mantener éste y todos los medicamentos alejados del alcance de los niños. Vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación.

Presentación:

Estuche que contiene frasco de plástico de alta densidad de color blanco, con tapa y sello, conteniendo un frasco x 100 mL.

Ante cualquier duda o consulta puede informarse con: VIVUNT CHILE PHARMA LTDA, Santa Lucía N°330 Piso 2°, Santiago Centro, Santiago.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. No recomiende este medicamento a otra persona.

Revisión: versión 1.0, julio 2021
100xxxx

Fabricante y titular del registro sanitario

Elaborado por SAVANT PHARM S.A.

Ruta Nacional N° 19, Km 204, El Tío, Córdoba- CP, X2432XAB Argentina.

Importador y titular del registro en Chile: VIVUNT PHARMA CHILE LIMITADA;

Santa Lucía N° 330, Piso 2°, Santiago, Región Metropolitana, Chile.

Distribuido por: LABORATORIO PHARMA ISA LIMITADA,

Colo Colo N° 263, Quilicura, Santiago de Chile.

Mayor información en www.ispch.cl

Reg. ISP N° F-27510/23